



Ένα παροδικό ισ-χαιμικό επεισόδιο, που ονομάζεται ε-πίσης "μίνι εγκε-φαλικό επεισόδιο", εμφανίζεται όταν ένας θρόμβος αίμα-τος εμποδίζει τη ροή του αίματος στον ε-γκέφαλο. Αυτή η απόφραξη είναι προσωρινή (παροδική) και, σε αντίθεση με το κανονικό εγκεφαλικό επεισόδιο, το «μίνι» εγκε-φαλικό δεν σκοτώ νει γενικά τον εγκεφαλικό ιστό...

Τα συμπτώ ματα σε ένα "μίνι" εγκεφαλικό επεισόδιο είναι σύντομα, συνήθως διαρκεί μερικά λεπτά έως μερικές ώ ρες, αν και μερικοί άνθρωποι μπορεί να έχουν συμπτώ ματα για έως και μία ολόκληρη ημέρα.

Με το να μπορείτε να αναγνωρίσετε τα πρώ ιμα σημάδια ενός παροδικού ισχαιμικού επεισοδίου θα καταφέρετε να το ξεπεράσετε ταχύτερα και με ασφάλεια.

Μίνι εγκεφαλικό: Συμπτώ ματα

Τα πιο κοινά συμπτώ ματα περιλαμβάνουν την κινητική δυσλειτουργία. Τις περισσότερες φορές, αυτό εκδηλώ νεται ως αδυναμία στη μία πλευρά του σώ ματος, η οποία ονομάζεται ημιπάρεση.

Αυτά τα συμπτώ ματα μπορεί να κυμαίνονται από ήπια έως σοβαρά. Εάν, ένας φίλος ή κάποιος κοντινός σας άνθρωπος βιώ νει ένα μίνι εγκεφαλικό επεισόδιο, μπορεί να παρατηρήσετε ήπια συμπτώ ματα, όπως αδεξιότητα των χεριώ ν ή των δακτύλων.

Ή, μπορεί να παρατηρήσετε πιο σοβαρά συμπτώ ματα, όπως μια πλήρη ανικανότητα βαδίσματος, ή αδυναμία μετακίνησης των χεριώ ν και των μυώ ν του προσώ που.

Ένας ασθενής μπορεί επίσης να παραπονεθεί για αδυναμία και στις δύο πλευρές του σώ ματος. Είναι επίσης πιθανό για έναν ασθενή, ο οποίος την στιγμή του επεισοδίου περπατάει, να παραπονεθεί για πόνο στο ένα πόδι, στο αντίστοιχο χέρι και αδυναμία στο πρόσωπο.

Επίσης, ένα "μίνι" εγκεφαλικό μπορεί να προκαλέσει δυσκολία στην ομιλία και προσωρινή τύφλωση στο ένα μάτι. Οι ασθενείς συχνά αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια του επεισοδίου δεν μπορούσαν να αρθρώ σουν ή και να κατανοήσουν

λέξεις (δυσφασία). Μάλιστα, η δυσφασία είναι πιθανό να αποτελέσει το μοναδικό σύμπτωμα του "μίνι εγκεφαλικού".

Όσον αφορά την τύφλωση στο ένα μάτι, αυτό είναι κάτι που διαρκεί από λίγα δευτερόλεπτα μέχρι μερικά λεπτά. Ο ασθενής με μίνι εγκεφαλικό επεισόδιο μπορεί επίσης να νιώθει μεγάλη ενόχληση, όταν εκτίθεται σε έντονο φως και να μην είναι σε θέση να διαβάσει τις λέξεις σε λευκές σελίδες.

Τέλος, ένα άτομο που παθαίνει παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο, είναι πολύ πιθανό να αισθανθεί ζαλάδα, ίλιγγο και απώλεια προσανατολισμού.

www.healthline.com